




**PLATE 1.** Figures 1–3: *Pinnularia micevskii* Levkov, Pavlov & Nakov sp. nov. (type population).  
Figure 1: 1 representing the holotype. Scale bar = 10  $\mu\text{m}$ . Figures 1–3: Mt. Šar Planina




**PLATE 2.** Figures 1–4: *Pinnularia micevskii* Levkov, Pavlov & Nakov sp. nov. Scale bar = 10 µm.  
Figures 1–4: Mt. Jablanica




**PLATE 3.** Figures 1–3: *Pinnularia lata* (Brébisson) Rabenhorst var. *lata*. Scale bar = 10  $\mu\text{m}$ .  
Figures 1–3: Mt. Šar Planina




**PLATE 4.** Figures 1–10: *Pinnularia lata* var. *minor* (Grunow) Cleve. Figures 11–20: *Pinnularia dubitabilis* Hustedt var. *dubitabilis*. Scale bar = 10 µm. Figures: 1–10, 12–16, 20. Mt. Šar Planina. Figure 11: Mariovo. Figures 17–19: Mt. Osogovo




**PLATE 5.** Figures 1–7: *Pinnularia subalpina* sp. nov. (type population).  
Figure 5: 3 representing the holotype. Scale bar = 10 µm. Figures 1–4: Lake Crno, Mt. Šar Planina.  
Figures 5–7: Small lake near Čardak, Mt. Šar Planina




**PLATE 6.** Figures 1–10: *Pinnularia rabenhorstii* (Grunow) Krammer var. *rabenhorstii*. Scale bar = 10 µm.  
Figures 1–5, 8, 9: Mt. Šar Planina. Figure 10: Mt. Pelister



**PLATE 7.** Figures 1–12: *Pinnularia rabenhorstii* var. *franconica* Krammer. Scale bar = 10 µm.  
Figure 1: Mariovo. Figures 2, 3, 5, 6: Mt. Šar Planina. Figures: 4, 7–12. Mt. Pelister




**PLATE 8.** Figures 1–12: *Pinnularia idshensis* sp. nov. (type population).  
Figure 8: 2 representing the holotype. Scale bar = 10  $\mu\text{m}$ . Figures 1, 2, 4, 5, 7–12: Mt. Pelister.  
Figures 3, 6: Mt. Šar Planina



**PLATE 9.** Figures 1–25: *Pinnularia borealis* Ehrenberg var. *borealis*. Scale bar = 10  $\mu\text{m}$ .

Figures 1–5, 11, 14, 25: Mt. Šar Planina. Figures 15, 16: Mt. Jablanica.


Figures 6–10, 12, 13, 17–24: Mt. Pelister




**PLATE 10.** Figures 1–16: *Pinnularia borealis* var. *scalaris* (Ehrenberg) Rabenhorst.

Figures 17–25: *Pinnularia borealis* Ehrenberg var. *borealis*. Scale bar = 10 µm.

Figures 1–8, 11–13, 16: Mt. Šar Planina. Figures 9, 10, 17–25: Mt. Pelister. Figures 14, 15: Mariovo



**PLATE 11.** Figures 1–13: *Pinnularia borealis* var. *islandica* Krammer.  
Figures 14–19: *Pinnularia idsbensis* sp. nov. Scale bar = 10 µm. Figures 1, 3, 4, 6, 9, 12: Mt. Šar Planina.  
Figures 2, 5: Mariovo. Figures 7, 8, 10, 11, 13–19: Mt. Pelister



**PLATE 12.** Figures 1-27: *Pinnularia borealis* var. *subislandica* Krammer. Scale bar = 10  $\mu\text{m}$ .

Figures 1, 2, 5-11, 14, 19-27: Mt. Šar Planina. Figures 3, 4: Mariovo.

Figures 12, 15, 17: Mt. Pelister. Figures 13, 16, 18: Village of Zabrčani, near Prilep (old well)

*Acknowledgements:* This study was partly supported by the Alexander von Humboldt Foundation from Germany. We are sincerely grateful to Luc Ector for providing to us a lot of published information on *Pinnularia* and also to Ditmar Metzeltin for his useful comments and immeasurable help with the identification of the taxa. At the same time, our gratitude goes to IDSB (Biology Students' Research Society) for the massive contribution to the Macedonian National Diatom Collection, namely the large number of samples collected during the annual sampling campaigns organized by this Society.

## REFERENCES

- [1] R. Patrick, C. W. Reimer, *The diatoms of the United States exclusive of Alaska and Hawaii*, Volume 1, *Fragilariaeae, Eunotiaceae, Achnanthesceae, Naviculaceae*, Monographs of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia **13**, 1966, pp. 1–688.
- [2] C. G. Ehrenberg, Mitteilungen über zwei neue asiatische Lager fossiler Infusorien-Erden aus dem russischen Trans-Kaukasien (Grusien) und Sibirien, *Ber. Bekanntm. Verh. Königl. Preuss. Akad. Wissenschaft. Berlin*, (1843), pp. 43–49.
- [3] P. T. Cleve, *Synopsis of the Naviculoid diatoms*, Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar **27**, 1895, pp. 1–220.
- [4] A. Mayer, Über den formenkreis von *Pinnularia borealis* Ehrbg. und *Pinnularia lata* (Bréb.) W. Smith, *Ber. Naturw. Verein Regensburg* **17** (1925), pp. 47–52.
- [5] A. Schmidt et al., *Atlas der Diatomaceenkunde*, Aschersleben-Leipzig 1874–1959.
- [6] K. Krammer, *Die Gattung Pinnularia in Bayern, Hoppea*, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft **52**, Regensburg, 1992, pp. 1–304.
- [7] K. Krammer, The genus *Pinnularia*, in: *Diatoms of Europe*, H. Lange-Bertalot (Ed.), A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell, 2000, pp. 1–703.
- [8] D. Metzeltin, H. Lange-Bertalot, Tropical diatoms of South America, I. About 700 predominantly rarely known or new taxa representative of the neotropical flora, in: *Iconographia Diatomologica*, **5**, H. Lange-Bertalot (Ed.), A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell, 1998, pp. 1–695.
- [9] D. Metzeltin, H. Lange-Bertalot, Tropical diatoms of South America, II. Special remarks on biogeography disjunction, in: *Iconographia Diatomologica* **18**, H. Lange-Bertalot (Ed.), A.R.G. Gantner Verlag K. G., Ruggell, 2007, pp. 1–877.
- [10] D. Metzeltin, H. Lange-Bertalot, S. Nergui, Diatoms in Mongolia, in: *Iconographia Diatomologica* **20**, H. Lange-Bertalot (Ed.), A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell, 2009, pp. 1–686.
- [11] B. Van de Vijver, Y. Frenot, L. Beyens, Freshwater diatoms from Ile de la Possession (Crozet Archipelago, Subantarctica), *Bibliotheca Diatomologica* **46**, J. Cramer, Berlin, Stuttgart, 2002, pp. 1–412.
- [12] B. Van de Vijver, *Pinnularia obesa* sp. nov. and *P. australorabenhorstii* sp. nov., two new large *Pinnularia* (sect. *Distantes*) from the Antarctic King George Island (South Shetland Islands), *Diat. Res.* **23** (2008), pp. 221–232.
- [13] B. Van de Vijver, R. Zidarova, Five new taxa in the genus *Pinnularia* sectio *Distantes* (Bacillariophyta) from Livingston Island (South Shetland Islands), *Phytotaxa* **24** (2011), pp. 39–50.
- [14] B. Van de Vijver, B. Chattová, D. Metzeltin and M. Lebouvier, The genus *Pinnularia* (Bacillariophyta) on Ile Amsterdam (TAAF, South Indian Ocean), *Nova Hedwigia*, Beiheft **141** (2012), pp. 201–236.
- [15] W. Bock, Distantes (*Pinnularia* – Bacillariophyceae), Eine kritische Zusammenstellung, *Nachr. Naturwiss. Mus. Aschaffenburg* **83** (1975), pp. 1–46.
- [16] L. Rabenhorst, *Die Süßwasser-Diatomaceen (Bacillarien) für Freunde der Mikroskopie*, Eduard Kummer, Leipzig, 1853, pp. 1–72.
- [17] F. Hustedt, Süßwasser-Diatomeen aus dem Albert-Nationalpark in Belgisch-Kongo, *Expl. Park Nat. Albert* **8** (1949), pp. 1–199.
- [18] C. Souffreau, P. Vanormelingen, B. Van de Vijver, T. Isheva, E. Verleyen, K. Sabbe and W. Vyverman, Molecular Evidence for Distinct Antarctic Lineages in the Cosmopolitan Terrestrial Diatoms *Pinnularia borealis* and *Hantzschia amphioxys*, *Protist* **164** (2013), pp. 101–115.
- [19] Z. Levkov, S. Krstic, T. Nakov, Lj. Melovski, Diatom assemblages on Shara and Nidze Mountains, Macedonia, *Nova Hedw.* **83** (2005), pp. 501–537.
- [20] Lj. Petrovska, P. Stojanov, Algenata flora na karpite vo Makedonija (Algal flora of wet rocks in Macedonia), *God. Zb. PMF, Skopje* **27–28** (1975), pp. 161–168.
- [21] Lj. Petrovska, P. Stojanov, Algenata flora vo ribnicite "Kamnik" – Skopsko (Algal flora of fishpond "Kamnik" – Skopje), *God. Zb. Biol.* **32** (1979), pp. 117–131.
- [22] S. Krstic, P. Stojanovski, Comparative microflora analysis in mouth waters of River Bosava and Anksa, Macedonia, *God. Zb. Biol.* **46** (1993), pp. 101–110.
- [23] H. Heiden and R.W. Kolbe, Die Marinen Diatomeen der Deutschen Südpolar-Expedition, 1901–1903. In: Deutsche Südpolar-Expedition, 1901–1903, herausgegeben von Erich von Drygalski **8** (1928), pp. 447–715.

- [24] R. Simonsen, The diatom types of Heinrich Heiden in Heiden & Kolbe, *Bibliotheca Diatomologica* 24, J. Cramer, Berlin, Stuttgart, 1992, pp. 1–100.
- [25] A. de Brébisson, Considérations sur les Diatomées et essai d'une classification des genres et des espèces appartenant à cette famille, *Brée l'Ainé Imprimeur-Libraire, Falaise* (1838), pp. 1–22.
- [26] A. Grunow, Algen und Diatomaceen aus dem Kaspischen Meere, in: *Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntnis der Kaukasusländer, auf Grund seiner Sammelbeute*, O. Schneider (ed.), Dresden, 1878, pp. 98–132.
- [27] E. Reichardt, Eine bemerkenswerte Diatomeen-assoziation in einem Queehabitat im Grazer Bergland, Österreich, in: *Iconographia Diatomologica*, 5, H. Lange-Bertalot (ed.), A.R.G. Gantner Verlag K.G., 2004, pp. 419–479.
- [28] W. Smith, *Synopsis of British Diatomaceae*, John van Voorst, London, 1853, pp. 1–89.
- [29] A. Grunow, Die Diatomeen von Franz Josefs-Land, *Denkschr. Math-Naturw. Classe, Kais. Akad. Wissensch. Wien*, 48 (1884), pp. 53–112.
- [30] A. Grunow, Ueber neue oder ungenügend bekannte Algen, Erste Folge, Diatomeen, Familie Naviculaceen, *Verh. Kais.-Königl. Zool-Bot. Ges. Wien*, 10 (1860), pp. 503–582.
- [31] L. Rabenhorst, *Flora Europaea Algarum aquae dulcis et submarinae, Sectio I, Algas diatomaceas complectens, cum figuris generum omnium xylographice impressis*, Apud Eduardum Kummerum, Lipsiae, 1864, pp. 1–359.

## ПРЕГЛЕД НА СЕКЦИЈАТА DISTANTES ОД РОДОТ *PINNULARIA* (BACILLARIOPHYTA) ВО МАКЕДОНИЈА; ДИВЕРЗИТЕТ И ДИСТРИБУЦИЈА

**Александар Павлов, Златко Левков**

<sup>1</sup>Институт за биологија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија

*Pinnularia* е еден од најголемите и најшироко распространети слатководни дијатомејски родови. Сепак, истражувањата посветени на секцијата *Distantes* од родот *Pinnularia* се малобројни. Значаен диверзитет на таксони од родот *Pinnularia* од секцијата *Distantes* е забележан во водните хабитати на неколку планински области во Македонија. Вкупно се евидентирани 12 таксони, од кои три се описани како нови видови: *Pinnularia idsbensis*, *P. micevskii* и *P. subalpina*. Главните морфолошки карактеристики се описаны за сите евидентирани таксони. За новите видови вклучени се и оние карактеристики кои ги одделуваат од најсличните таксони. Дополнителен коментар е даден за распространувањето на секој од забележаните таксони како и за хабитатите кои ги наследува. Хабитатите кои овие таксони ги наследуваат се разликуваат според типот и надморската височина, односно опфатени се: високопланински езера, со глацијално или неглацијално потекло, извори, потоци, реки и тресетишта, како и стари бунари за водоснабдување, но исто така и трајни или привремено влажни карпи.

**Клучни зборови:** дијатомеи; *Pinnularia*; sectio *Distantes*; диверзитет; Македонија